

# NITROSAR



## NUTRICIONALES

Abono nitrogenado líquido de **liberación controlada**



CONTENIDO DECLARADO:	% p/v
NITRÓGENO.....	30%
AZUFRE.....	6,5%
MAGNESIO.....	3,32%
BORO.....	0,13%
MOLIBDENO.....	0,001%

DENSIDAD:  
1,30 gr/cc

pH:9

[ SL ]

ENVASES

5 L - 20L

PRODUCTO EXENTO DE CLORUROS  
Abono Nitrogenado grupo 09




# N

**NITROSAR** está especialmente formulado con dos tipos de Nitrógeno: uno aprovechable de forma inmediata por la planta y otro de liberación progresiva que aporta una nutrición controlada y mantenida durante varias semanas.

## COMPOSICIÓN

Nitrógeno total (N).....	30,00
(N) Ureico .....	20,02
(N) Urea Formaldehído .....	9,98
Trióxido de Azufre (SO <sub>3</sub> ).....	6,50
Boro (B).....	0,13
Magnesio (MgO) .....	3,32
Molibdeno (Mo).....	0,001



**NITROSAR** contiene:

**66% de Nitrógeno Ureico** aprovechable de forma directa por las plantas.

**34% de Nitrógeno procedente de Urea Formaldehído**, de liberación progresiva que aporta una nutrición controlada y mantenida durante varias semanas evitando pérdidas por lixiviación.

El **N-Formaldehído** se pone a disposición de la planta por hidrólisis química y microbiana cuando se dan las condiciones ideales de desarrollo y actividad de la misma, lo que supone una **sincronización** entre necesidad y disponibilidad.

## DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Se utiliza mediante aplicación foliar aprovechando los tratamientos que habitualmente se realizan o bien por aplicación en riego por goteo.

Se aconseja repetir al menos 2 ó 3 veces los tratamientos con NITROSAR a lo largo del ciclo del cultivo.

**FOLIAR**

**5 - 10 L/Ha**

**GOTEO**

**10 - 15 L/Ha**


- **En Olivar** se recomiendan tres aplicaciones durante la primavera con intervalos de 15-21 días.
- **En Frutales** es aconsejable realizar las aplicaciones después de la floración. Aplicar tres tratamientos en primavera.
- **En Cereales** aplicar espaciados unos 20 días durante el ahijado y el encañado.
- **En Hortícolas** se aplican de 2 a 5 tratamientos durante todo el ciclo vegetativo.
- **En Maíz** a partir de 4-6 hojas aplicar dos tratamientos.
- **En Viña** hacer dos aplicaciones, una al inicio y otra a la mitad del envero.



[www.sarabia.eu](http://www.sarabia.eu)

En nuestra web encontrarás toda la información adicional que necesites.  
[sarabia@sarabia.eu](mailto:sarabia@sarabia.eu)

Con la garantía de:  
**SARABIA**



Síguenos en redes como Sarabia Agro