


# PHYTOSARCAN



FUNGICIDA SISTÉMICO

Control eficaz  
de **REPILO**

(*Spilocaea oleaginea*)

Aumenta las defensas  
naturales de los  
**OLIVOS**



COMPOSICIÓN

**FOSFONATO POTÁSICO 51% [SL] P/V**

(Equivalente como mezcla de Fosfonatos Potásicos 790 gr/l)

Nº REGISTRO ES-00303

ENVASES 1 L - 5 L - 10 L

**OLIVAR**



P

**PHYTOSARCAN** es un fungicida preventivo y curativo de absorción inmediata totalmente sistémico (ascendente y descendente) que protege al olivo desde dentro mediante un mecanismo de triple acción:

## TRIPLE ACCIÓN PHYTOSARCAN

Actúa directamente sobre el hongo patógeno destruyendo las paredes celulares e impidiendo la formación de esporas reproductoras.

Retrasa y bloquea los procesos de transferencia de energía del hongo, con lo cual cesa toda su actividad infecciosa.

Estimula importantes procesos metabólicos implicados en la superación del estrés patológico, ambiental y nutricional mediante la síntesis de **FITOALEXINAS** que ayudan a reforzar las defensas. Código **FRAC P07** (Inductor de las defensas naturales en la planta huésped).

La triple acción de **PHYTOSARCAN** además impide la aparición de resistencias por parte del hongo.

### PHYTOSARCAN

contribuye a la protección eficaz de los brotes nuevos en crecimiento activo, al actuar desde dentro independientemente de las condiciones climáticas desfavorables que puedan presentarse.

### PHYTOSARCAN

se puede emplear en mezcla con los tratamientos habituales que realizamos en el olivar (cobres, abonos foliares, aminoácidos, insecticidas, correctores de carencias, etc.) sin ningún tipo de problema de compatibilidad.

### PHYTOSARCAN

potencia la acción polivalente de otros fungicidas que se apliquen conjuntamente dado su gran efecto sinérgico.

## DOSIS Y MODO DE EMPLEO

USO: OLIVO

AGENTE: REPILO (*Spillocaea oleaginea*)

Autorizado para uso profesional al aire libre mediante pulverización foliar, realizando una única aplicación.

Dosis = **2,5** (L/Ha)

Volumen de caldo en (L/Ha)  
**[800 - 1.000]**

Aplicar desde BBCH 11 (Se inicia el desarrollo de las hojas, desde que las primeras hojas se separan del todo y tienen un color gris verdoso), hasta BBCH 81 (En la maduración, al comienzo de la coloración de los frutos).

Plazo de seguridad = **15** días.

*El repilo del olivo está considerada la enfermedad más importante del olivar, ya que es de las más extendidas por nuestra geografía y afecta directamente a la producción de aceitunas, al provocar importantes defoliaciones en los olivos.*



[www.sarabia.eu](http://www.sarabia.eu)

En nuestra web encontrarás toda la información adicional que necesites.  
[sarabia@sarabia.eu](mailto:sarabia@sarabia.eu)

Con la garantía de:  
**SARABIA**



Síguenos en redes como Sarabia Agro